



Nach einer Parodontose - Behandlung

beachten Sie bitte die folgenden **Verhaltensregeln:**

Blutungsgefahr: Keine großen körperlichen Anstrengungen, keinen Sport !
(Nachblutungsgefahr)

Essen: Essen Sie erst, wenn das volle Gefühl an der betäubten Stelle wiedergekehrt ist.
Wenig Alkohol und **nicht rauchen**, auch am folgenden Tag!

Zähneputzen: **3 Tage lang:** Zahnpflege sorgfältig weiter betreiben, dabei aber Nähte und unmittelbaren Wundbereich nicht berühren. Benutzen Sie in dieser Zeit **keine Munddusche im frisch behandelten Gebiet.**
Die verordnete **Spülflüssigkeit** bitte regelmäßig morgens und abends wie folgt anwenden: **1.** alle Zahnpastareste gründlich mit Wasser ausspülen dann **2.** mit ca. 10 ml Spüllösung 30sec. lang spülen, anschließend ausspucken. Die Spülflüssigkeit bitte ca. 1 Woche über den letzten Eingriff hinaus verwenden.

Schwellung: **In keinem Fall** innerhalb der ersten 48 Stunden **Wärme** anwenden (z.B. Sauna, Sonnenbäder)!

Schmerzen: Schmerzen im Wundgebiet nach Abklingen der Spritzenwirkung sind möglich. Sie können notfalls Schmerztabletten einnehmen.
Treten allerdings sehr starke Schmerzen erst nach 2 bis 3 Tagen auf, so müssen Sie sich sofort zur Nachbehandlung melden.

***Wir wünschen Ihnen gute Besserung
Ihr Praxisteam***